



# Grandes Cultures

# AVERTISSEMENTS AGRICOLES®

POUR DE BONNES PRATIQUES AGRICOLES

## ILE DE FRANCE

Bulletin Technique n°18 du 11 juin 2003 - 2 pages - Numéro ordre postal : 49

### Pois

STADES : 4 à 7 étages de gousses.

### Ravageurs

Pour les tordeuses, la semaine passée a encore été très active avec, sur un grand nombre de sites, près d'une centaine de nouvelles captures. La majorité des sites cumulent désormais entre 200 et 300 captures (voir carte). Quelques pièges dépassent les 300, dans l'est de la Seine et Marne (Poigny, Passy / Seine), dans le sud Essonne (Abbeville la rivière, Angerville, et Mespuits, le seul cas au dessus de 400), et quelques autres comme à Ablis (78), Montreuil / Epte (95), Villeroy (nord 77). Le temps chaud devrait encore accroître le vol.

*Pour les pois pour l'alimentation humaine (pois de conserve, pois jaunes), la protection doit être maintenue.*

*Pour les pois protéagineux, le seuil d'intervention de 400 captures cumulées pourrait être atteint en fin de semaine - début de semaine prochaine dans les secteurs où les captures sont actuellement de l'ordre de 200 à plus de 300.*

### Maladies

Les passages pluvieux et les températures

élevées favorisent là aussi les maladies. Si l'anthracnose est généralement bien contenue par la protection fongicide, on note :

- la présence de botrytis sur gousses dans de très nombreuses parcelles,
- des attaques plus occasionnelles de sclerotinia sur tige (dessèchement tige principale ou ramifications).

Contre ces deux maladies, les imides présentent les meilleurs efficacités. Compte tenu qu'il n'y a quasiment plus de fleurs, il est trop tard pour faire une intervention spécifique. Pour l'anthracnose, un troisième passage de chlorthalonil est parfois valorisé en année humide, dans les parcelles à fort potentiel.

### Féverole

STADES : 8 à 12 étages de gousses, 4 à 8 étages de fleurs.


### Ravageurs

Les fortes températures annoncées sont susceptibles de favoriser l'activité des bruches.

### Maladies

La succession de conditions humides et chaudes permet le développement des maladies :  
- la rouille progresse tant en fréquence (voir tableau) qu'en intensité. Outre la Seine et

CAPTURES DE TORDEUSES AU 10 JUIN  
réseau SRPV - FREDON - CAIF



Des  
ravageurs  
actifs.

Pois  
Féverole  
Des maladies  
aussi.

Service Régional de la  
Protection des Végétaux  
ILE DE FRANCE

10 rue du séminaire  
94516 RUNGIS cedex  
Tél : 01-41-73-48-00  
Fax : 01-41-73-48-48

Bulletin réalisé avec la  
participation de la  
FREDON Ile de France


Imprimé à la station  
d'Alertes  
Agricoles de Rungis  
Directeur gérant :  
BOULUD

Publication périodique  
P.P.A.P.  
n°0904 B 00536  
ISSN n°0767-5542

Tarif individuel 2003 :  
65 euros

©, SPV  
40-20 48744

P122







# ENQUETE DESHERBAGE ANTI-GRAMINEES

Comme l'an passé, nous vous proposons de participer à une enquête sur le désherbage anti - graminées de vos blés. L'objectif est de réaliser à grande échelle (7 régions participantes) un état des lieux sur l'importance du salissement des parcelles et sur la réussite ou non du désherbage. Cette année s'annonce instructive, notamment en raison des conditions climatiques particulières que l'on a connu.

Nous vous remercions par avance de bien vouloir y participer, pour 1,2 ou 3 parcelles de blé de votre exploitation, que vous ayez ou non des problèmes de désherbage, afin que l'enquête soit la plus représentative possible des situations rencontrées en plaine. Les résultats seront diffusés cet automne.

\*\*\*\*\*

ENQUETE A RETOURNER AU SRPV – 10 rue du séminaire – 94516 RUNGIS ou par fax au 01-41-73-48-48.

NOM :

PRENOM :

ADRESSE :

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| Nom de la parcelle  |  |  |  |
| Date de semis   |  |  |  |
| Labour (oui/non)  |  |  |  |
| Précédent   |  |  |  |
| Travail superficiel en interculture (oui/non)   |  |  |  |
| Herbicide total en interculture (oui/non)   |  |  |  |
| Anti-graminées utilisés (date, produits, doses)   |  |  |  |
| VULPINS<br>Niveau d'infestation initial *   |  |  |  |
| Désherbage satisfaisant (oui/non)   |  |  |  |
| RAY GRASS<br>Niveau d'infestation initial *   |  |  |  |
| Désherbage satisfaisant (oui/non)   |  |  |  |
| AUTRES GRAMINEES<br>BIEN MAITRISEES   |  |  |  |
| AUTRES GRAMINEES<br>MAL MAITRISEES  |  |  |  |
| VOS REMARQUES OU EXPLICATIONS SUR LES ECHECS EVENTUELS (climat, résistance, choix de produit, pratiques culturales, dicots mal maîtrisés...). |  |  |  |

\* NIVEAU INFESTATION : Elevé (>50/m<sup>2</sup>) / Moyen / Faible (<10/m<sup>2</sup>)

7123